

Liste des essences autorisées pour les plantations de haies au 01/07/2023

Nom latin	Nom commun	Essence locale	Disponible en label VL	Essence fourragère complémentaire
<i>Acer campestre</i> L., 1753	Erable champêtre	x	x	
<i>Acer platanoides</i>	Erable plane			x
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	Aulne glutineux	x	x	
<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	Bouleau pubescent	x	x	
<i>Betula verrucosa</i> ou <i>Betula pendula</i>	Bouleau verruqueux	+ MFR	x	
<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	Charme	x	x	
<i>Castanea sativa</i>	Chataigner	x		x
<i>Cornus mas</i> L., 1753	Cornouiller mâle	x	x	
<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	Cornouiller sanguin	x	x	
<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier	x	x	
<i>Crataegus germanica</i> / <i>Mespilus germanica</i>	Néflier	x	x	
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825	Aubépine lisse / à 2 styles	x	x	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine monogyne / à 1 style	x	x	
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	Genêt à balai	x	x	
<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	Fusain d'Europe	x	x	
<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	Hêtre	x	x	
<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768 (<i>Rhamnus frangula</i>)	Bourdaine	x	x	
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753*	Frêne commun*	x	x	x
<i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>oxycarpa</i> (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso, 1971*	Frêne oxyphylle*	x	x	x
<i>Hippophae rhamnoides</i> L., 1753	Argousier	x	x	
<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx	x	x	
<i>Juniperus communis</i> L., 1753	Génévrier commun	x	x	
<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	Troène commun	x	x	
<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des bois	x	x	
<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des haies	x	x	
<i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768	Pommier sauvage	x	x	
<i>Morus alba</i>	Mûrier blanc			x
<i>Morus nigra</i>	Mûrier noir			x
<i>Populus alba</i> L., 1753	Peuplier blanc	x	x	
<i>Populus nigra</i>	Peuplier noir	x		x
<i>Populus tremula</i> L., 1753	Peuplier tremble	x	x	
<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	Merisier	x	x	
<i>Prunus mahaleb</i> L., 1753	Cerisier Sainte Lucie	x	x	
<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Prunellier	x	x	
<i>Pyrus communis</i> subsp. <i>pyraster</i> (L.) Ehrh., 1780	Poirier sauvage / franc	x	x	
<i>Pyrus cordata</i> Desv., 1818	Poirier à feuille en cœur	x	x	
<i>Quercus cerris</i>	Chêne chevelu	x		
<i>Quercus ilex</i> L., 1753	Chêne vert	x	x	
<i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784	Chêne rouvre / Chêne sessile	x	x	
<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	Chêne pubescent	x	x	
<i>Quercus pyrenaica</i>	chêne tauzin	x		
<i>Quercus robur</i> L., 1753	Chêne pédonculé	x	x	
<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	Nerprun purgatif	x	x	
<i>Ribes rubrum</i> L., 1753	Groseiller à grappe	x	x	
<i>Rosa canina</i> L., 1753	Eglantier	x	x	
<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Fragon	x	x	
<i>Salix alba</i> L., 1753	Saule blanc	x	x	
<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	Saule roux	x	x	
<i>Salix caprea</i> L., 1753	Saule marsault	x	x	
<i>Salix cinerea</i> L., 1753	Saule cendré	x	x	
<i>Salix fragilis</i> L., 1753	Saule fragile	x	x	
<i>Salix purpurea</i> L., 1753	Saule pourpre	x	x	
<i>Salix triandra</i> L., 1753	Saule à 3 étamines	x	x	
<i>Salix viminalis</i> L., 1753	Saule des vanniers	x	x	
<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	Sureau noir	x	x	
<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753	Sorbier des oiseleurs	x	x	
<i>Sorbus domestica</i> L., 1753	Cormier	x	x	
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763	Alisier torminal	x	x	
<i>Taxus baccata</i> L., 1753	If	x	x	
<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	Tilleul à petites feuilles	x	x	
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771	Tilleul à grandes feuilles			x
<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	Ajonc d'Europe	x	x	
<i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784	Orme lisse	x	x	
<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Orme champêtre	x	x	
<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	Viorne lantane	x	x	
<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	Viorne obier	x	x	
<i>Prunus domestica</i> var. <i>insititia</i> (L.) Fiori & Paol., 1898	Prunier de Damas	x	x	

* Espèce autorisée sous réserve que ce soit un Végétal local et dans la limite de 20 à 30 %